

Tabela 4. Okres dyspersji połęgowej (ODPL) ptaków w rejonie elektrowni wiatrowej.

	Gatunek			10 VII	25 VII	7 VIII	20 VIII	razem	udział [%]
1	szpak	<i>Sturnus vulgaris</i>	STVUL	12	21	38	70	141	26,6
2	grzywacz	<i>Columba palumbus</i>	COPAL	1	5	14	39	59	11,1
3	zięba	<i>Fringilla coelebs</i>	FRCOE			24	35	59	11,1
4	mazurek	<i>Passer montanus</i>	PAMON	9	14	12	21	56	10,5
5	dymówka	<i>Hirundo rustica</i>	HIRUS	6	9	10	12	37	7,0
6	czajka	<i>Vanellus vanellus</i>	VAVAN		21	7		28	5,3
7	żuraw	<i>Grus grus</i>	GRGRU		3	5	11	19	3,6
8	szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>	CACAR			11	7	18	3,4
9	skowronek	<i>Alauda arvensis</i>	ALARV	4	6	2	3	15	2,8
10	pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>	MOFLA	1	2	5	7	15	2,8
11	bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	CICIC	3	5	4		12	2,3
12	bogatka	<i>Parus major</i>	PAMAJ	1	1	5	4	11	2,1
13	kwiczoł	<i>Turdus pilaris</i>	TUPIL			3	5	8	1,5
14	trznadel	<i>Emberiza citrinella</i>	EMCIT	3	1	3	1	8	1,5
15	czapla siwa	<i>Ardea cinerea</i>	ARCIN		4	1	2	7	1,3
16	pokląska	<i>Saxicola rubetra</i>	SARUB	3	2			5	0,9
17	myszołów zwyczajny	<i>Buteo buteo</i>	BUBUT		1		3	4	0,8
18	sroka	<i>Pica pica</i>	PIPIC	2	2			4	0,8
19	dzwoniec	<i>Carduelis chloris</i>	CACHL	4				4	0,8
20	potrzeszcz	<i>Emberiza calandra</i>	EMCAL	1	2	1		4	0,8
21	kruk	<i>Corvus corax</i>	COX			1	2	3	0,6
22	błotniak stawowy	<i>Circus aeruginosus</i>	CIAER	1			1	2	0,4
23	świergotek łąkowy	<i>Anthus pratensis</i>	ANPRA		1	1		2	0,4
24	pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>	MOALB	2				2	0,4
25	kos	<i>Turdus merula</i>	TUMER	1	1			2	0,4
26	kapturka	<i>Sylvia atricapilla</i>	SYATR	2				2	0,4
27	gęgawa	<i>Anser anser</i>	ANANS	1				1	0,2
28	kulik wielki	<i>Numenius arquata</i>	NUARQ				1	1	0,2
29	łozówka	<i>Acrocephalus palustris</i>	ACPAL	1				1	0,2
30	pierwiosnek	<i>Phylloscopus collybita</i>	PHCOL		1			1	0,2
razem				58	102	147	224	531	